

消基會：半數阿斯匹林說明書，未列酒精警語！

- ◆ 阿斯匹林（Aspirin，乙醯水楊酸）是家戶常備鎮痛解熱用藥，不當使用卻可能引發致命危險。[消基會](#)日前調查市售阿斯匹林說明書（仿單）後意外發現，藥品雖經衛生署審核同意販售，卻有許多未依規定在仿單中加註警語，其中又以未標註「酒精併用警告」違規比率五十%最高，讓消費者置身於用藥危機中。
 - ◆ 衛生署食品藥物管理局長康熙洲說，七十五年即規定阿斯匹林藥品應於仿單刊載雷氏症候群、酒精及蠶豆症的「警語」，對懷孕、分娩、授乳婦女使用該藥品的「注意事項」也要刊載。且依據藥品查驗登記審查準則規定，仿單中的禁忌、警語、副作用及注意事項，應使用紅字或加印紅框或粗黑異體字，食品藥物管理局將請地方衛生局進行查核，違者依藥事法罰三到十五萬元。
 - ◆ 康熙洲說明，阿斯匹林依據適應症及用法用量的不同，分為處方藥及指示藥，提醒醫師為民眾開立阿斯匹林藥品時，應審慎評估病人病史及用藥情形（例如蠶豆症等）。消基會委員、高雄長庚神經科系腦血管科醫師陳偉熹指出，針對阿斯匹林，國內一共核可一〇七張許可證，消基會這次針對其中十八種腸溶膠囊的仿單分析，發現亂象叢生。包括「雷氏症候群」及「酒精併用警告」為政府要求加註的警語，卻有二十七·八%及五十%仿單沒刊載；另重要訊息也參差不齊，對懷孕、分娩及授乳的注意事項刊載不全；至於亞洲人特有致命的副作用蠶豆症，則只有三分之一仿單有提示。
 - ◆ 禁忌欄資訊太簡化：陳偉熹說，臨床上，有許多人因為使用阿斯匹林引發氣喘死亡，不少人則出現腸胃道出血，但調查發現，部分藥廠怕禁忌寫多了沒人敢吃，「禁忌欄」上的重要資訊能簡化就簡化，氣喘等可能引發死亡的嚴重副作用僅放在「注意事項欄」。
 - ◆ 消基會調查發現，歐美先進國家提醒的阿斯匹林重要警示內容，在國內販售的仿單中，僅對過敏引起氣喘病史、活動性胃腸道潰瘍（含糜爛性胃炎）的提醒達一百%，抗凝血藥品併用提醒達九十四%，最後妊娠期提醒為八十九%，出血體質（含凝血異常或血友病）的提醒八十三%。至於提醒留意雷氏症候群、合併甲氨蝶呤使用超過每星期十五毫克、嚴重肝臟障礙、嚴重腎臟障礙、鈉離子滯留疾病、分娩、哺乳、酒精併用警告、抗痙攣藥品併用、排尿酸藥品併用、蠶豆症等，則各仿單呈現不全。（資料來源：消基會網站）
- ※ 以上資料提供本監同仁及來監接見家屬參考，如遇有消費糾紛或爭議請撥「1950」轉接至各縣（市）政府消費者服務中心（消保官）或中華民國消費者文教基金會尋求協助。

法務部矯正署明德外役監獄政風室 提醒您